

Karta Ostrzegawcza Pacjenta

Należy mieć tę kartę zawsze przy sobie i pokazać ją każdemu pracownikowi personelu medycznego.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Forxiga® (dapagliflozyna) – dotyczy wyłącznie wskazania cukrzyca typu 1

Objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej:

Jama ustna i żołądek: nudności lub wymioty, bóle brzucha, uczucie nasilonego pragnienia/suchość w jamie ustnej (oznaki odwodnienia), słodki lub metaliczny smak w ustach.

Oddech, oddychanie i zapach: przyspieszony i pogłębiony oddech, słodki zapach wydychanego powietrza, nietypowy zapach moczu lub potu.

Inne objawy: podwyższony poziom ketonów w moczu lub we krwi, szybka utrata masy ciała, zaburzenia świadomości, uczucie nietypowej senności lub zmęczenia.

Jeżeli masz objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub udaj się natychmiast do szpitala i niezwłocznie przerwij przyjmowanie leku Forxiga®.

Pamiętaj:

U pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Forxiga® cukrzycowa kwasica ketonowa może wystąpić nawet w sytuacji, gdy poziom cukru we krwi jest poniżej 14 mmol/l (250 mg/dl). Określa się to jako „euglikemiczna cukrzycowa kwasica ketonowa”.

Dane kontaktowe pacjenta i lekarza



Imię i nazwisko pacjenta:

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

Data rozpoczęcia leczenia
produktem leczniczym Forxiga®:

Osoba z rodziny lub inna osoba
do kontaktu w sytuacjach nagłych:

Numer telefonu osoby z rodziny lub innej
osoby do kontaktu:

Informacje dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek



Ten pacjent przyjmuje produkt leczniczy Forxiga® (dapagliflozyna) w leczeniu cukrzycy typu 1.

- Jest to lek stosowany dodatkowo do insuliny.
- Należy do grupy „inhibitorów SGLT-2”.

Należy czasowo przerwać stosowanie produktu leczniczego Forxiga® przed zabiegiem chirurgicznym lub hospitalizacją z powodu ciężkiego ostrego stanu chorobowego.

Jeśli występują objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej, należy niezwłocznie ocenić pacjenta pod kątem rozpoznania cukrzycowej kwasicy ketonowej.

- Ocenę pod kątem cukrzycowej kwasicy ketonowej należy przeprowadzić niezależnie od stężenia glukozy we krwi.
- U pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Forxiga® cukrzycowa kwasica ketonowa może wystąpić nawet w sytuacji, gdy stężenie glukozy we krwi jest poniżej 14 mmol/l (250 mg/dl). Określa się to jako „euglikemiczna cukrzycowa kwasica ketonowa”.

Leczenie cukrzycowej kwasicy ketonowej

- **Jeżeli podejrzewasz cukrzycową kwasicę ketonową:** należy zapewnić pacjentowi natychmiastową opiekę medyczną i natychmiast odstawić lek Forxiga®.
- **Leczenie euglikemicznej cukrzycowej kwasicy ketonowej wymaga:** podania dodatkowej dawki insuliny, spożycia dodatkowych węglowodanów oraz podania płynów.

W żadnym wypadku nie należy całkowicie lub tymczasowo przerywać insulinoterapii.

Niniejsze materiały, Przewodnik dla pacjenta i opiekuna oraz ulotka dla pacjenta są dostępne na stronie internetowej:
www.forxiga-rmp-pacjent.pl