

Instrukcja użycia

Fasenra 30 mg

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Benralizumab

Do wstrzyknięcia podskórnego

Ampułko-strzykawka do jednorazowego użycia

Przed użyciem leku Fasenra w ampułko-strzykawce lekarz powinien pokazać pacjentowi lub opiekunowi pacjenta jak poprawnie podawać lek.

Należy przeczytać tę “Instrukcję użycia” przed rozpoczęciem stosowania leku Fasenra w ampułko-strzykawce i za każdym razem, gdy pacjent otrzymuje ten lek. Mogą pojawić się nowe informacje. Podane tu informacje nie zastępują rozmowy z lekarzem na temat choroby występującej u pacjenta lub jej leczenia.

Jeśli pacjent lub opiekun pacjenta mają jakiegokolwiek pytania, powinni zwrócić się z nimi do lekarza.

Ważne informacje

Lek Fasenra należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C w tekturowym pudełku aż do czasu podania leku. Lek Fasenra można przechowywać w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C przez maksymalnie 14 dni. Po wyjęciu z lodówki lek Fasenra należy zużyć w ciągu 14 dni lub wyrzucić.

Nie stosować leku Fasenra w ampułko-strzykawce, jeśli:

- lek został zamrożony
- lek został upuszczony lub uszkodzony
- zabezpieczenie na tekturowym pudełku zostało przerwane
- termin ważności leku (EXP) minął

Nie:

- wstrząsać ampułko-strzykawką
- udostępniać innym osobom i nie używać ponownie ampułko-strzykawki

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy wyrzucić ampułko-strzykawkę do odpornego na przebicie pojemnika na ostre odpady i użyć nowej ampułko-strzykawki.


Każda ampułko-strzykawka z lekiem Fasenra zawiera 1 dawkę leku Fasenra przeznaczoną wyłącznie do jednorazowego użycia.

Lek Fasenra i wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek Fasenra w ampułko-strzykawce


Nie zdejmować osłony na igłę przed wykonaniem wszystkich czynności aż do Kroku 6 tej instrukcji i gotowością do wstrzyknięcia leku Fasenra.

Nie dotykać klipsów uruchamiających osłonę igły, aby uniknąć przedwczesnego uruchomienia osłony zabezpieczającej igłę.



Krok 1 – Zgromadzić materiały

- 1 ampulko-strzykawka z lekiem Fasenra wyjęta z lodówki
- 1 gazik nasączony alkoholem
- 1 wacik lub gazik
- 1 odporny na przebicie pojemnik na ostre odpady.
(Patrz Krok 9 – Usunąć zużytą ampulko-strzykawkę)



Ampulko-strzykawka



Gazik nasączony alkoholem



Wacik lub gazik



Pojemnik na ostre odpady

Krok 2 – Przygotować ampulko-strzykawkę do użycia

Sprawdzić termin ważności (EXP). Nie używać, jeśli termin ważności minął. **Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy odczekać około 30 minut aż lek Fasenra ogrzeje się osiągając temperaturę pokojową wynoszącą 20°C do 25°C.**

Nie ogrzewać ampulko-strzykawki w żaden inny sposób. Na przykład nie ogrzewać jej w mikrofalówce ani w gorącej wodzie i nie umieszczać jej w pobliżu innych źródeł ciepła.

Lek Fasenra należy użyć w ciągu 14 dni od wyjęcia z lodówki.




Krok 3 – Obejrzeć płyn

Chwycić trzon strzykawki (nie tłok), aby wyjąć ampułko-strzykawkę.

Należy obejrzeć płyn patrząc przez okienko kontrolne. Płyn powinien być przezroczysty i bezbarwny do żółtego. Płyn może zawierać małe, białe cząstki.

Nie wstrzykiwać leku Fasenra, jeśli płyn jest mętny, przebarwiony lub zawiera duże cząstki.

Płyn może zawierać mały pęcherzyk powietrza; jest to sytuacja normalna. Nie ma konieczności podejmowania żadnego działania w związku z obecnością pęcherzyka powietrza.



Krok 4 – Wybrać miejsce wstrzyknięcia


Zalecany miejscem wstrzyknięcia jest przednia powierzchnia uda. Lek można także wstrzyknąć w dolną część brzucha.

Nie wstrzykiwać leku:

- w promieniu 5 cm od pępka
- w miejsca, gdzie skóra jest bolesna, posiniaczona, łuszcząca lub stwardniała
- w blizny lub uszkodzoną skórę
- przez ubranie

Opiekun pacjenta może wstrzyknąć lek w górną część ramienia, udo lub brzuch. **Nie** należy próbować wstrzykiwać sobie leku w ramię.

Przy każdym wstrzyknięciu należy wybierać inne miejsce na skórze, znajdujące się w odległości co najmniej 3 cm od miejsca ostatniego wstrzyknięcia.




Krok 5 – Oczyszczyć miejsce wstrzyknięcia

Umyć dokładnie ręce wodą z mydłem.

Oczyszczyć miejsce wstrzyknięcia przecierając je gazikiem nasączonym alkoholem, wykonując koliste ruchy. Pozostawić do wyschnięcia.

Nie dotykać oczyszczonego miejsca przed wykonaniem wstrzyknięcia.

Nie osuszać oczyszczonego miejsca za pomocą urządzeń mechanicznych ani nie dmuchać na nie.



Krok 6 – Zdjąć osłonę igły

Trzymając za trzon strzykawki jedną ręką, drugą ręką ostrożnie zdjąć osłonę igły ruchem po linii prostej.


Nie trzymać za tłok ani za główkę tłoka podczas zdejmowania osłony igły.

Odłożyć osłonę igły na bok, aby ją później wyrzucić.

Na czubku igły może być widoczna kropla płynu; jest to zjawisko normalne.

Nie używać strzykawki, jeśli zostanie ona upuszczona bez osłony na igłę lub jeśli igła jest uszkodzona bądź zanieczyszczona.

Nie dotykać igły i uważać, by igła nie dotykała żadnej powierzchni. Niezwłocznie przejść do kolejnych kroków.



Krok 7 – Wstrzyknąć lek Fasenra



Trzymać ampułko-strzykawkę jedną ręką, jak pokazano na rysunku.

Drugą ręką delikatnie chwycić skórę w miejscu wstrzyknięcia palcami i przytrzymać. Dzięki temu powierzchnia wstrzyknięcia będzie bardziej stabilna.

Nie naciskać tłoka zanim igła nie zostanie całkowicie wprowadzona w skórę.

Nie odciągać tłoka do tyłu w żadnym momencie.

Wstrzyknąć lek Fasenra wykonując czynności pokazane na rysunkach **a**, **b** i **c**.




Szybkim, zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę w fałd skóry.

Iglę wprowadzić pod kątem 45 stopni.



Nacisnąć główkę tłoka kciukiem.

Naciskać tłok opuszczając go do samego końca. Dzięki temu cały lek zostanie wstrzyknięty.



Naciskając główkę tłoka kciukiem wyjąć igłę ze skóry. Powoli zwolnić nacisk na tłok, co spowoduje uruchomienie osłony igły.


Krok 8 – Obejrzeć miejsce wstrzyknięcia

W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi lub płynu. Jest to zjawisko normalne.

Delikatnie ucisnąć miejsce na skórze wacikiem lub gazikiem do czasu, gdy krwawienie ustanie.

Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia.

W razie potrzeby osłonić miejsce wstrzyknięcia niewielkim bandażem.



Krok 9 – Wyrzucić zużytą ampułko-strzykawkę

- Każda ampułko-strzykawka zawiera pojedynczą dawkę leku Fasenna i **nie wolno używać jej ponownie**.
- Bezpośrednio po użyciu należy umieścić zużytą ampułko-strzykawkę w odpornym na przebicie **pojemniku na ostre odpady**.

Nie wyrzucać ampułko-strzykawki do domowych pojemników na odpadki.

Nie nakładać ponownie osłony na ampułko-strzykawkę.

Oslonę i pozostałe zużyte materiały należy wyrzucić do domowego pojemnika na odpadki.



Wskazówki dotyczące usuwania

Pełny pojemnik należy usunąć zgodnie ze wskazówkami podanymi przez lekarza lub farmaceutę.

Nie poddawać recyklingowi zużytego pojemnika na ostre odpady.