
Instrukcja użycia
Klygefa roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym gefurulimab
Tylko do podania podskórnego

Niniejsza „Instrukcja użycia" zawiera informacje dotyczące wykonywania wstrzyknięć leku Klygefa za pomocą wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego.




Decyzję o tym, czy lek ten można wstrzykiwać samodzielnie, podejmują pacjent oraz lekarz lub pielęgniarka. Nie należy samodzielnie wstrzykiwać leku bez wcześniejszego przeszkolenia przez fachowy personel medyczny. Wstrzyknięcia może również wykonywać inna osoba, pod warunkiem, że została przeszkolona.
Jeśli pacjent lub opiekun ma jakieś pytania, powinien zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych.

Należy sprawdzić receptę.

Jeśli przepisano:


600 mg
Należy użyć **2 wstrzykiwaczy** aby podać 2 wstrzyknięcia.



Drugie wstrzyknięcie podaje się bezpośrednio po pierwszym wstrzyknięciu.

lub

300 mg
Należy użyć **1 wstrzykiwacza** aby podać 1 wstrzyknięcie.



W razie wątpliwości dotyczących dawki należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne informacje przed wstrzyknięciem leku Klygefa

Przechowywanie leku Klygefa
- Lek Klygefa należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C do 8°C.
- Lek Klygefa należy przechowywać w pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.
- Wstrzykiwacz należy wyrzucić, jeżeli był pozostawiony w temperaturze pokojowej przez dłużej niż 24 godziny.
- Lek Klygefa oraz wszystkie inne leki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przygotowywanie wstrzykiwacza z lekiem Klygefa
- **Nie** zdejmować nasadki z igły, dopóki osoba wykonująca wstrzyknięcie nie będzie gotowa do podania leku, aby zapobiec jego wyschnięciu.
- Chwycić korpus wstrzykiwacza i dla bezpieczeństwa trzymać dłonie z dala od końcówki z igłą.
- **Nie** dotykać końcówki z igłą. Mogłoby to spowodować przypadkową aktywację.


Nie używać wstrzykiwacza z lekiem Klygefa, jeśli:
- był już wcześniej używany;
- był zamrożony;
- był potrząsany, upuszczony, uszkodzony lub naruszony;
- jest przeterminowany;
- zawiera cząstki;
- igła, po zdjęciu nasadki, była w kontakcie z jakąkolwiek powierzchnią.

Jeśli wystąpi którakolwiek z tych sytuacji, wstrzykiwacz należy wyrzucić do odpornego na przekłucie pojemnika na ostre odpady i użyć nowego wstrzykiwacza.


Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony z lekiem Klygefa

Po zakończeniu wstrzyknięcia fioletowa końcówka zablokuje się na igle.

Przed użyciem:



Po użyciu:




PRZYGOTOWANIE

1. Sprawdzić dawkę

Należy sprawdzić receptę, aby upewnić się, jaką dawkę przepisał lekarz.

Jeśli przepisano:

600 mg
Należy użyć **2 wstrzykiwaczy** do podania 2 wstrzyknięć.



lub

300 mg
Należy użyć **1 wstrzykiwacza** do podania 1 wstrzyknięcia.




2. Przygotowanie materiałów

Na czystej płaskiej powierzchni zgromadzić następujące materiały medyczne: *(Patrz rycina A)*

- gaziki nasączone alkoholem
- waciki
- plastry samoprzylepne opatrunkowe
- pojemnik na ostre odpady

Uwaga: wymienione materiały medyczne nie są dostarczane w pudełku ze wstrzykiwaczem.




Rycina A

3. Wyjąć z lodówki potrzebne pudełko (a) z lekiem

Wyjąć z lodówki potrzebną liczbę pudełek do podania wyznaczonej dawki. *(Patrz rycina B)*
Sprawdzić, czy pudełka nie są uszkodzone.
Sprawdzić termin ważności.

4. Wyjąć wstrzykiwacz (lub wstrzykiwacze) z pudełka

Otworzyć pudełko.
Chwycić korpus wstrzykiwacza i wyjąć go z pudełka. *(Patrz rycina B)*
Nadmiarowe wstrzykiwacze wstawić z powrotem w pudełku do lodówki.



Rycina B

5. Obejrzeć wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony

Sprawdzić, czy wstrzykiwacz nie jest uszkodzony.
Sprawdzić termin ważności. *(Patrz rycina C)*


- **Nie** dotykać fioletowej końcówki igły. Może to spowodować przedwczesną aktywację wstrzykiwacza.
- **Nie** używać, jeśli wstrzykiwacz jest przeterminowany lub widoczne są uszkodzenia.



Rycina C

6. Obejrzeć lek

Upewnić się, że płyn jest lekko żółty lub przezroczysty. *(Patrz rycina D)*
Sprawdzić, czy w płynie nie są widoczne cząstki.
Pęcherzyki powietrza są zjawiskiem normalnym.



Rycina D

7. Poczekać, aż wstrzykiwacz się ogrzeje

Przed użyciem należy pozostawić wstrzykiwacz w temperaturze pokojowej na 45 minut. *(Patrz rycina E)*
Dzięki temu wstrzyknięcie będzie mniej odczuwalne.

- **Nie** należy używać zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kuchenka mikrofalowa lub gorąca woda, do podgrzewania wstrzykiwacza.
- **Nie** używać wstrzykiwacza, jeżeli był pozostawiony poza lodówką przez dłużej niż **24 godziny**. Wstrzykiwacz należy w bezpieczny sposób zutylizować i użyć nowego wstrzykiwacza.



Rycina E

8. Umyć ręce

Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. *(Patrz rycina F)*




Rycina F

9. Wybrać miejsce wstrzyknięcia

Wybrać miejsce wstrzyknięcia inne niż to, w którym wykonano poprzednie. Jeśli przepisana dawka wymaga wykonania 2 wstrzyknięć, można wykonać je w tym samym miejscu, zachowując odstęp 2,5 cm między miejscami wstrzyknięcia.
Wstrzyknięcia można wykonywać w następujące miejsca: *(Patrz rycina G)*

- Dolna część brzucha (podbrzusze), z wyjątkiem obszaru w promieniu 5 cm wokół pępka
- Przednia część uda
- Tylna część ramion (wstrzyknięcia w tym miejscu może wykonywać wyłącznie opiekun)



Wstrzykiwanie samodzielne lub przez opiekuna


Wyłącznie wstrzykiwanie przez opiekuna

Rycina G

10. Zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia

Miejsce wstrzyknięcia należy przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem i pozostawić skórę do wyschnięcia. *(Patrz rycina H)*

- **Nie** wstrzykiwać w miejsca, gdzie skóra swędzi, jest stwardniała, tkliwa, bolesna, zasiniała, zaczerwieniona lub ma blizny.
- **Nie** dotykać ani nie dmuchać na odkażony obszar skóry przed wykonaniem wstrzyknięcia.



Rycina H


WYKONYWANIE WSTRZYKNIĘCIA

Co należy wiedzieć przed wykonaniem wstrzyknięcia:

- **Nie** zdejmować nasadki z igły, dopóki osoba wykonująca wstrzyknięcie nie będzie gotowa do podania leku; zapobiegnie to wyschnięciu leku.
- **Nie** używać wstrzykiwacza, który został upuszczony.
- **Nie** zakładać ponownie nasadki na igłę, ponieważ grozi to ukłuciem się lub uszkodzeniem igły.
- **Nie** dotykać fioletowej końcówki z igłą, ponieważ może to spowodować przedwczesną aktywację wstrzykiwacza.

11. Zdjąć nasadkę igły


Trzymając wstrzykiwacz za korpus, prostym pociągnięciem zdjąć nasadkę z igły. *(Patrz rycina I)*
Nasadkę igły natychmiast wyrzucić.



Rycina I

12. Ustawić wstrzykiwacz w odpowiednim położeniu


Mocno chwycić wstrzykiwacz. Uważać, aby nie zasłonić okienka.
Przyłożyć fioletową końcówkę z igłą płasko do skóry. *(Patrz rycina J)*



Rycina J

13. Mocno docisnąć


Docisnąć, aby rozpocząć wstrzykiwanie, i mocno trzymać.
Powoli odliczać na głos do 15, pamiętając o przyciskaniu wstrzykiwacza, aby podać całą dawkę leku.
Przed doliczeniem do 15 można usłyszeć odgłosy klikania, ale nie przestawać dociskać wstrzykiwacza. *(Patrz rycina K)*



Rycina K

14. Sprawdzić, czy wstrzyknięto całą dawkę


Przed odsunięciem wstrzykiwacza od powierzchni skóry sprawdzić, czy całe okienko jest fioletowe.
Następnie odsunąć wstrzykiwacz od skóry. *(Patrz rycina L)*



Rycina L

Jeśli dawka wynosi 600 mg

Używając drugiego wstrzykiwacza powtórzyć opisane czynności, rozpoczynając od kroku 5. Wykonać wstrzyknięcie w odległości 2,5 cm od miejsca pierwszego wstrzyknięcia.



lub

Jeśli dawka wynosi 300 mg


Przejść do kroku 15.

Niewykorzystane wstrzykiwacze należy przechowywać w pudełku tekturowym i wstawić z powrotem do lodówki.

15. Sprawdzić miejsce wstrzyknięcia

Sprawdzić miejsce wstrzyknięcia. W przypadku zauważenia krwi przycisnąć wacik lub gazik do miejsca wstrzyknięcia. *(Patrz rycina M)*

Jeśli będzie to konieczne, nalepić plaster. **Nie** pocierać miejsca wstrzyknięcia.



Rycina M

UTYLIZACJA

16. Usunąć wstrzykiwacz

Zaraz po użyciu zużyte wstrzykiwacze należy umieścić w pojemniku na ostre odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami. *(Patrz rycina N)*

- **Nie** wyrzucać wstrzykiwacza do domowego pojemnika na odpady.



Rycina N

Jeśli nie dysponujemy pojemnikiem na ostre odpady, można użyć pojemnika domowego, który:

- jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
- można go zamknąć szczelnie przylegającą, odporną na przebicie pokrywką, zapobiegającą wydostaniu się ostrych przedmiotów na zewnątrz,
- jest stabilny i nie przewróci się podczas użytkowania,
- jest szczelny (płyn nie będzie z niego wyciekał),
- jest odpowiednio oznakowany, aby poinformować o zawartości niebezpiecznych odpadów wewnątrz pojemnika.

Gdy pojemnik na ostre odpady będzie już niemal pełny, należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpowiedniego sposobu utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji ostrych odpadów, należy zapytać świadczeniodawcę opieki zdrowotnej o rozwiązania dostępne w danym rejonie.

- **Nie** należy wyrzucać używanego pojemnika na ostre odpady do odpadów domowych, chyba że pozwalają na to lokalne przepisy.
- **Nie** oddawać pełnego pojemnika na odpady ostre do recyklingu.